



Живлення перцю солодкого у другому обороті

Солодкий перець (*Capsicum annuum* var. *Annuum*) — високорентабельна культура, що добре підходить для вирощування у другому обороті, коли з кожною вибіркою росте й ціна реалізації. Однак високий урожай якісної продукції можна отримати лише за наявності у ґрунті достатньої кількості усіх елементів живлення в доступній для рослин формі. Якщо певного елемента не вистачає, за-

вдання фермера полягає у грамотному й своєчасному його внесенні протягом усього періоду вегетації з урахуванням потреби у різні періоди росту й розвитку рослин.

Як підкреслюють фахівці, важливо розрізняти два поняття: потреба у простій наявності того чи іншого елемента в ґрунті й інтенсивне його споживання. На 1 т урожаю (разом з вегетативною масою) солодкий перець виносить приблизно N4–5,6P1,2–2,2K5,2–6,8. Крім того, ця культура дуже чутлива до нестачі мікроелементів (бору, марганцю, цинку, йоду тощо), тож мова має вестися саме про збалансоване живлення.

Загальна схема підживлення солодкого перцю у другому обороті наведена у таблиці. Втім, співвідношення азоту й калію може змінюватися залежно від особливостей сорту чи гібриду й інтенсивності віддачі врожаю. Важливо також слідкувати за вологістю повітря й температурою в теплиці — через спеку рослини можуть зупинитися у рості, й тоді на 2–3 тижні серпня у підживленні має переважати азот. Та загалом у літні місяці теплиці чи балагани слід притінювати, щоб уберегти рослини від стресів через різкі перепади температури й вологості повітря.



Схема живлення перцю у закритому ґрунті

(джерело: vladam-seeds.com.ua)

Період	Співвідношення NPK (в умовних одиницях)	Ca
Висадка розсади	1 : 2 : 1	—
До зав'язування першого ярусу плодів	1 : 1,1 : 1,2	+
До зав'язування другого ярусу	1 : 0,5 : 1	++
До першого збору (зеленого плоду)	1,2 : 0,5 : 1,7–2	++
Під час масового дозрівання	1 : 0,5 : 2,5–3	++

До початку плодоутворення акцент зазвичай робиться на азотному живленні, а найбільше фосфору рослини потребують від початку цвітіння до формування й дозрівання плодів. У цей час для кореневого підживлення слід використовувати фосфор у легкодоступній для рослин формі.

Впродовж усієї вегетації рослини перцю потребують багато калію. Він необхідний, перш за все, для формування великих квіток і плодів. У період дозрівання та збору врожаю калій підвищує якість плодів (лежкість, транспортабельність, цукристість, смакові якості та інтенсивність кольору). У ґрунті цей елемент іноді знаходиться переважно у нижніх шарах, тож для слабкої кореневої системи перцю важкодоступний. Саме через це у підживленні рослин від початку цвітіння калій має переважати.

Добрива можна вносити як кожне окремо, так і у бакових сумішах.

З інших елементів живлення варто відзначити кальцій. Він зміцнює судини, прискорює розвиток і дозрівання плодів. Нестача кальцію у період формування плодів, серед інших причин, провокує верхівкову гниль, тому оптимальні норми цього мезоеlementу забезпечують високу стійкість рослин до хвороб. У той же час, він міцно пов'язаний з ґрунтовим комплексом і слабо засвоюється кореневою системою, особливо за підвищених температур. Відтак, наприкінці літа цей елемент краще вносити позакоренево.

Не можна забувати й про мікроелементи, що оптимізують ріст і розвиток рослин і у певних межах балансують засвоєння ними азоту, фосфору й калію. Засвоювати ці елементи у великих кількостях допомагає магній, тож він обов'язково має бути складовою комплексних добрив. Як і бор, котрий украй важливий для покращення процесів цвітіння й зав'язування плодів. 



Актоцид®

На захисті ваших рослин!



КИССОН
www.kisson-agro.com.ua

Запоріжжя (067) 617-22-59 | Одеса (067) 619-91-88
Дніпро (063) 797-84-20 | Харків (067) 613-44-75
Вінниця (067) 632-25-85 | Суми (067) 617-45-05
Тернопіль (067) 623-73-37

